



Exercício 1.1 Preencha os espaços identificados com  $\square$  de modo a obter proposições verdadeiras:

- a)  $\frac{3}{8} \square 0,37$ ;                      c)  $\sqrt{2} \square 1,414$ ;                      e)  $\frac{3}{7} \square 0,428571$ ;  
b)  $0,33 \square \frac{1}{3}$ ;                      d)  $5 \square \sqrt{25}$ ;                      f)  $\frac{22}{7} \square \pi$ .

Exercício 1.2 Escreva sob a forma de dízima as seguintes frações:

- a)  $\frac{3}{7}$ ;                      b)  $\frac{29}{4}$ ;                      c)  $\frac{7}{101}$ ;                      d)  $\frac{274301}{3300}$ .

Exercício 1.3 Represente os seguintes números racionais sob a forma de quociente de números inteiros:

- a) 1,25;                      b) 2,374;                      c) 5,(3);                      d) 54,134(728).

Exercício 1.4 Encontre um número racional e um número irracional no intervalo:

- a)  $] \frac{1}{1000}, \frac{2}{1000} [$ ;                      b)  $] \frac{1}{101}, \frac{1}{100} [$ ;                      c)  $] \frac{\pi}{101}, \frac{\pi}{100} [$ .

Exercício 1.5 Sejam  $x$  e  $y$  dois números reais tais que  $x < y$ . Diga, justificando, se cada uma das seguintes relações é verdadeira ou falsa:

- a)  $x^2 < y^2$ ;                      c)  $\frac{1}{x} < \frac{1}{y}$  ( $x, y \neq 0$ );  
b)  $x^3 < y^3$ ;                      d)  $x < \frac{x+y}{2} < y$ .

Exercício 1.6 No que se segue  $x$  e  $y$  representam números reais e  $n$  representa um número natural. Indique quais das seguintes relações são verdadeiras. Dê um contraexemplo para as relações que forem falsas.

- a)  $\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$ ;                      c)  $(x+y)^n = x^n + y^n$ ;  
b)  $\sqrt{xy} = \sqrt{x}\sqrt{y}$ ;                      d)  $(xy)^n = x^n y^n$ .

Exercício 1.7 Em cada uma das alíneas seguintes encontre encontre números reais  $a$  e  $\varepsilon$  de modo a que a solução da inequação  $|x - a| < \varepsilon$  seja o intervalo dado:

- a)  $] -2, 2 [$ ;                      c)  $] 0, 4 [$ ;  
b)  $] -4, 0 [$ ;                      d)  $] -3, 7 [$ .

Exercício 1.8 Represente em extensão os seguintes conjuntos:

- a)  $\{x \in \mathbb{R} : |x + 4| = 3\}$ ;                      d)  $\{x \in \mathbb{R} : (x^2 - 7)^2 = 0\}$ ;  
b)  $\{x \in \mathbb{R} : \sqrt{(x+1)^2} = 3\}$ ;                      e)  $\{x \in \mathbb{R} : \sqrt{3x+1} = 2x\}$ ;  
c)  $\{x \in \mathbb{R} : |x| = |x+2|\}$ ;                      f)  $\{x \in \mathbb{R} : |x| |x+3| = 4\}$ .

Exercício 1.9 Exprima cada uma dos conjuntos seguintes na forma de intervalo ou reunião de intervalos:

- a)  $\{x \in \mathbb{R} : 1 - x \leq 2\}$ ;                      k)  $\{x \in \mathbb{R} : 2 < |x| < 3\}$ ;  
b)  $\{x \in \mathbb{R} : 0 \leq 1 - 2x \leq 1\}$ ;                      l)  $\{x \in \mathbb{R} : |x - 1| < |x - 2|\}$ ;  
c)  $\{x \in \mathbb{R} : x^2 > 5\}$ ;                      m)  $\{x \in \mathbb{R} : \frac{1-x}{2x+3} > 0\}$ ;  
d)  $\{x \in \mathbb{R} : x^2(x^2 - 1) \geq 0\}$ ;                      n)  $\{x \in \mathbb{R} : |x + 2| + |x - 2| < 10\}$ ;  
e)  $\{x \in \mathbb{R} : |5 - \frac{1}{x}| < 1\}$ ;                      o)  $\{x \in \mathbb{R} : |x^2 - 1| \leq 1\}$ ;  
f)  $\{x \in \mathbb{R} : |3 - x| \geq 2\}$ ;                      p)  $\{x \in \mathbb{R} : 2x^2 \leq 4\}$ ;  
g)  $\{x \in \mathbb{R} : |5x + 2| \leq 1\}$ ;                      q)  $\{x \in \mathbb{R} : 4 < x^2 < 9\}$ ;  
h)  $\{x \in \mathbb{R} : x^3 \geq 4x\}$ ;                      r)  $\{x \in \mathbb{R} : \frac{x}{x-2} \leq 0\}$ ;  
i)  $\{x \in \mathbb{R} : 6x^2 - 5x \leq -1\}$ ;                      s)  $\{x \in \mathbb{R} : |x - 3| < 2|x|\}$ ;  
j)  $\{x \in \mathbb{R} : |3x - 2| \leq 1\}$ ;                      t)  $\{x \in \mathbb{R} : |x + 1| > |x - 3|\}$ .

Exercício 1.10 Determine o conjunto dos majorantes, o conjunto dos minorantes e, se existirem, o supremo, o ínfimo, o máximo e o mínimo de cada um dos seguintes conjuntos:

- a)  $[-\sqrt{5}, 3] \cap \mathbb{Q}$ ;  
b)  $[0, \sqrt{3}] \cap \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ;  
c)  $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 11\}$ ;  
d)  $\{x \in \mathbb{R} : |x - 5| < 3\}$ ;  
e)  $\{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 25/16\}$ ;  
f)  $\{x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : x \leq 0 \wedge |x^2 - 1| < x + 5\}$ ;  
g)  $\{x \in \mathbb{R} : 5 - x^2 < 1\}$ ;  
h)  $\{2 + 1/n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 1\}$ .

Exercício 1.11 Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = 1 + |x|$ . Considere os conjuntos

$$A = f([-4, 1[) \quad \text{e} \quad B = f(] - \infty, -2]).$$

- a) Especifique os conjuntos  $A$  e  $B$  e determine os correspondentes conjuntos de majorantes e de minorantes.  
b) Determine, se existirem, o supremo, o ínfimo, o máximo e o mínimo de cada um dos conjuntos considerados.

Exercício 1.12 Indique, justificando, o valor lógico de cada uma das seguintes proposições:

- a)  $\forall x \in \mathbb{R} : x > 7 \Rightarrow |x| > 7$ ;  
b)  $\forall x \in \mathbb{R} : |1 + 4x| < 1 \Rightarrow x \geq -\frac{1}{2}$ ;  
c)  $\forall x \in \mathbb{R} : |x| \geq 1 \Rightarrow x \geq 1$ ;  
d)  $\forall x \in \mathbb{R} : |x - 5| \leq 2 \Rightarrow 3 < x < 7$ .