



1° Teste :: 22 de novembro de 2021

Duração :: 1h45m

Nome: Número:

Justifique, convenientemente, todas as respostas.

Exercício 1. (1 valor) Represente o número racional 2,33(4) sob a forma de quociente de dois números inteiros.

Exercício 2. (1 valor) Resolva a inequação $|2x+1| \leq |x+2|$, com $x \in \mathbb{R}$.

Exercício 3. (2.5 valores) Considere o conjunto

$$A = \left\{ \frac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} \cup \left([\sqrt{2}, 3] \cap (\mathbb{R} \backslash \mathbb{Q}) \right).$$

- (a) Indique, caso existam, o supremo, o máximo, o ínfimo e o mínimo do conjunto A.
- (b) Determine o derivado (A') do conjunto A.

Exercício 4.

- 1. (2 valores) Considere o conjunto $S =]2, 3[\cup]4, +\infty[$. Em cada alínea apresente um exemplo, justificando, de uma sucessão de termos em S que seja:
- (a) não monótona e convergente para 6; (b) não majorada e admita uma subsucessão convergente para 3.

2. (1 valor) Diga, justificando, se a proposição seguinte é **verdadeira** ou **falsa**:

A sucessão
$$(u_n)_n$$
 de termo geral $u_n=\left\{ egin{array}{ll} n^3 & \mbox{se} & n\leq 70 \\ \dfrac{1-\cos n}{n^2} & \mbox{se} & n>70 \end{array}
ight.$

Exercício 5.

Reference 5.
1. (1.5 valores) Calcule a soma da série
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5^{n-1}}{7^n} + \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} \right).$$


2. (2 valores) Responda a <u>uma e uma só</u> das duas questões seguintes:

I. Estude a natureza da série $\sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{\operatorname{sen} n}{(n+2)!}$. II. Verifique se a série $\sum_{n\in\mathbb{N}} (-1)^n \frac{n}{n^3+4}$ é absolutamente convergente.


Exercício 6. (3 valores) Considere a função $f:[-5,5]\longrightarrow \mathbb{R}$ cujo gráfico se apresenta na figura seguinte.


(a) Determine f([-1,4]).





(c) Indique os pontos de mínimo (minimizantes) local de f.





(e) Determine, justificando, o maior valor positivo para δ de modo a que seja verdadeira a implicação seguinte:

$$0 < |x+3| < \delta \Rightarrow |f(x)-3| < 2$$
.

Exercício 7. (3 valores) Considere a função
$$f:\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
 definida por $f(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 1 & \text{se} \quad x \in \mathbb{Z} \\ -x^2+1 & \text{se} \quad x \in \mathbb{Q} \backslash \mathbb{Z} \\ |x+1| & \text{se} \quad x \in \mathbb{R} \backslash \mathbb{Q} \end{array} \right.$ Determine, justificando, o domínio de continuidade da função f .

Exercício 8. (3 valores) Diga, justificando, se cada uma das proposições seguintes é verdadeira ou falsa:

$$\text{(a)} \quad \text{Se } f,g:\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \text{ são tais que } f(\mathbb{R}) = [-1,1] \text{ e} \quad g(x) = \left\{ \begin{array}{ll} x+1 & \text{se} \quad x \leq -2 \\ 4+\cos x & \text{se} \quad -2 < x < 0 \\ \frac{1}{x+3} & \text{se} \quad x \geq 0 \end{array} \right. , \quad \text{então } g \circ f = [-1,1] \text{ e} \quad g(x) = \left\{ \begin{array}{ll} x+1 & \text{se} \quad x \leq -2 \\ 4+\cos x & \text{se} \quad -2 < x < 0 \\ \frac{1}{x+3} & \text{se} \quad x \geq 0 \end{array} \right. , \quad \text{então } g \circ f = [-1,1] \text{ e} \quad g(x) = \left\{ \begin{array}{ll} x+1 & \text{se} \quad x \leq -2 \\ 1+\cos x & \text{se} \quad -2 < x < 0 \end{array} \right. , \quad \text{então } g \circ f = [-1,1] \text{ e} \quad g(x) = \left\{ \begin{array}{ll} x+1 & \text{se} \quad x \leq -2 \\ 1+\cos x & \text{se} \quad -2 < x < 0 \end{array} \right. , \quad \text{então } g \circ f = [-1,1] \text{ e} \quad g(x) = \left\{ \begin{array}{ll} x+1 & \text{se} \quad x \leq -2 \\ 1+\cos x & \text{se} \quad -2 < x < 0 \end{array} \right. , \quad \text{então } g \circ f = [-1,1] \text{ e} \quad g(x) = [$$

- (b) Existe uma função $f:X\longrightarrow \mathbb{R}$ contínua que nunca se anula e que toma valores positivos e negativos.
- (c) A soma de duas funções $f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ e $g:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ monótonas é uma função monótona.

FIM